

Plan  
d'alimentation

# DAIRY MAX : Croissance accélérée




## 2 repas/jour

Semaine	Repas /jour	Concentration	L de buvée /repas	
1	j. 1-3	150 g/L de buvée, ou 165 g/L d'eau	colostrum	CONCENTRE DE SEVRAGE, EAU, BONNE PAILLE A VOLONTE
	j. 4-7		2,5	
2	2		3	
3	2		3,5	
4	2		4	
5	2		4	
6	2		4	
7	2		4	
8	2		3	
9	2		2,5	
10	1	2,5		
SEVRAGE				

## DISTRIBUTION AU SEAU

## ALIMENT



Dairy Max

## 1 repas/jour

Semaine	Repas /jour	Concentration	L de buvée /repas	
1	j. 1-3	200 g/L de buvée, ou 230 g/L d'eau	colostrum	CONCENTRE DE SEVRAGE, EAU, BONNE PAILLE A VOLONTE
	j. 4-7		2	
2	2		2,5	
3	2		3	
4	1		4	
5	1		4,5	
6	1		4,5	
7	1		4	
8	1		3	
9	1		2	
10	1			
SEVRAGE				

Plan  
d'alimentation

# DAIRY MAX : Croissance accélérée



## ALLAITEMENT AUTOMATIQUE

## CONCENTRATION

150 g/L de buvée,  
ou 165 g/L d'eau

### Par période

Age/ période	Durée de la période (j)	Volume de buvée/jour		
		En début de période (L)	En fin de période (L)	
Jour 1 à 3	3	Colostrum à volonté		
1 <sup>ère</sup> période	21	4,5	7,5	Concentré de sevrage, eau, bonne paille à volonté
2 <sup>ème</sup> période	18	7,5	7,5	
3 <sup>ème</sup> période	26	7,5	3,0	

### Par semaine

Semaine	Volume de buvée/j (L)	
Jour 1 à 3	Colostrum à volonté	
Jour 4 à 7	4,5	Concentré de sevrage, eau, bonne paille à volonté
2	6,0	
3	7,5	
4 à 7	8,0	
8	6,0	
9	5,0	
10	2,5	

Sans OGM

Fabriqué  
en France

Distribution  
libre

Veaux et génisses  
d'élevage

## Les conseils Vodor

### PRÉPARATION BUVÉE



Température de l'eau : 45/50°C



Peser la quantité de Vodor Tech nécessaire et verser. Bien respecter la concentration



Agiter 20 à 30 secondes

### DISTRIBUTION BUVÉE

■ Horaires de distribution réguliers, buvée servie 40 à 45°C.

■ Bien refermer les sacs entamés pour éviter les souillures extérieures, stocker dans un endroit sec.

**REMARQUE** : Utilisez des récipients propres lavés à l'eau javellisée après chaque repas.

Attention à la qualité de l'eau !